



Brodilux Cereals

Rodenticide (PT 14) lokmiddel klaar voor gebruik (korrel) voor de bestrijding van veldmuizen en ratten (binnen en buiten rond gebouwen)
NIET-PROFESSIEEEL GEBRUIK (BREED PUBLIEK)
Bevat 0,0027 % m/m Brodifacoum tech. (CAS n° 56073-10-0)
Toelatingsnummer : BE2025-0008
Toelatingshouder & leverancier: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12 35026 Conselve Italië
Tel. +39 049 9597737, www.zapispa.com, info@zapispa.com

KENMERKEN: Brodilux® Cereals is een lokaas op graanbasis in sachets van 25 g voor de bestrijding van veldmuizen, bruine ratten en zwarte ratten in alle ontwikkelingsstadia. Het bevat brodifacoum, een zeer krachtige verbinding, enkele feed, voor een volledige bestrijding van knaagdierpopulaties die alle bekende resistenties doorbreekt. Dankzij zijn werking sterven de knaagdiere zonder achterdocht ten aanzien van het lokaas te waken bij de andere leden van de kolonie. Brodilux® Cereals is een uitgebalanceerde mix van 5 elementen die speciaal zijn ontworpen om bovengenoemde knaagdiere aan te trekken: gebroken maïs, havervlokken, hele zonnebloempitten, suiker en FLUO-NP® technologie - een speciaal additief dat het lokaas gemakkelijk herkenbaar maakt, ook bij weinig licht, evenals de uitwerpselen van de knaagdiere, die helder oplichten onder UV-licht. Door met een handzame UV-lamp (black light) op de knaagdiere uitwerpselen te schijnen is het spoor van de knaagdiere eenvoudig te zien en te volgen. Dit lokaas is ideaal voor de behandeling tegen zwarte ratten en veldmuizen en in situaties waarin knaagdiere zich voornamelijk voeden met maïszaden, zoals in landelijke en zoötechnische gebouwen, graanschuren, varkenshouderijen en bepaalde civiele en industriële gebieden (voederproductie, meelverwerking, molens, enz.). Brodilux® Cereals bevat een bitterstof (*denatoniumbenzoaat*) om menselijke consumptie te helpen voorkomen.

Gevenaarsaanduidingen: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. **Veiligheidsaanbevelingen:** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Stof niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijnde nationale/regionale voorschriften.

Gefahrenhinweise: Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition. **Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Staub nicht einatmen. Bei Unwohlsein: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter gemäß den geltenden nationalen/regionalen Vorschriften zuführen.



WAARSCHUWING/ACHTUNG
UFI : 7630-P012-M005-4Y95

GBRUIKSIJNSTRUCTIES

Veldmuizen - breed publiek (niet-professionele gebruiker) - binnen en buiten rond gebouwen
Doelorganisme: Veldmuis (*Microtus agrestis*)
Dosis: 45-50 g lokaas per lokaaspunt. Afstand tussen lokaaspunten 2-5 m. Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten. De aasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdiere te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen. Gebruik buiten rond gebouwen: Plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.
Ratten - breed publiek (niet-professionele gebruiker) - binnen en buiten rond gebouwen
Doelorganisme: Bruine rat (*Rattus norvegicus*), Zwarte rat (*Rattus rattus*)
Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten. Dosis: 90-100 g lokaas per lokaaspunt. Afstand tussen lokaaspunten 5-10 m. De aasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdiere te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen. Gebruik buiten rond gebouwen: Plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

Verdeeld door:
Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be



Scan für Gebrauchsanweisung
auf Deutsch:



ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken. Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen. Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdiere (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het gefeesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierepopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt. Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdiereactiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.). Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt. Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdiere, boerderijdiere en andere niet-doel diersoorten. Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee. Plaats lokaasdozen niet in de buurt van afwatersystemen waar ze met water in contact kunnen komen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product. Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelingsperiode. Zakjes met het lokaas niet openen.

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. Gebruik bloedverdunnende rodenticiden niet als permanente lokaas (bijv. ter preventie van knaagdiereplagen of om knaagdiereactiviteit te detecteren.) Het product dient te worden gebruikt in slagvaste lokaasdozen. Etiketter lokaasdozen conform de informatie aangegeven op dit etiket. Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdiere binnen 35 dagen. In geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdiereactiviteit waargenomen) dient de gebruiker de productleverancier te raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst te bellen. Zoek en verzamel op regelmatige tijdstippen de dode knaagdiere kadavers, minstens bij elke controle van de lokaasdozen. Dode knaagdiere moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming. **Gebruik buiten rond gebouwen:** gebruik het product niet dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten).

EHBO INSTRUCTIES EN NOODMAATREGELEN OM MENS, DIER EN MILIEU TE BESCHERMEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine. Tegengif: vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel. **CONTACT MET DE HUID:** de huid met water wassen. Indien er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **CONTACT MET DE OGEN:** Indien er symptomen optreden, met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen als dit eenvoudig mogelijk is. Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **NA INSLIKKEN:** de mond spoelen. Bij symptomen: Bel 112/ een ambulance voor medische hulp. Zonder symptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Informatie aan gezondheidszorgpersoneel/arts: Start zo nodig levensreddende maatregelen, bel daarna een ANTIGIFCENTRUM. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts. **BIJ INADEMING:** Indien er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "Niet verplaatsen of openen. Bevat een rodenticide: Brodilux Cereals - toelatingsnummer BE2025-0008; werkzame stof brodifacoum. In geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het Antigifcentrum België: 070 245 245". Gevaarlijk voor diere in het wild.

INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT EN ZIJN VERPAKKING

De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming. Ongebruikt product niet in de grond, in waterwegen, in afvoerleidingen (gootsteen, toiletten...) of in de riolering lozen.

VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN DE HOUDBAARHEID VAN HET PRODUCT

Op een droge, open en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren. Op een plaats bewaren waartoe kinderen, vogels, huis- en boerderijdiere geen toegang hebben. Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum. Opslaan bij een temperatuur onder de 35 °C. Tegen licht beschermen. Niet bewaren in de buurt van eten, drinken en diervoeders.

OVERIGE INFORMATIE

Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn. Knaagdiere kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdiere niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen. Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.

WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende uit het gebruik van het product.

Meer informatie:

Plus d'information :

www.edialux.com



Brodilux Cereals

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de grain pour le contrôle des campagnols des champs et rats (à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments) et pour le Luxembourg des souris domestiques (à l'intérieur)
USAGE NON PROFESSIONNEL (GRAND PUBLIC)
Contient : 0,0027 % p/p de Brodifacoum tech. (CAS n° 56073-10-0)
Numéro de l'autorisation : Belgique : BE2025-0008 ; G-D de Luxembourg : LU0034691-0000
Détenant de l'autorisation & fournisseur: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve Italie
Tel. +39 049 9597737, www.zapispa.com, info@zapispa.com

PROPRIÉTÉS

Brodilux® Cereals est un appât rodenticide caractérisé par un mélange de céréales, conditionné en sachets individuels de 25 g, pour le contrôle des souris domestiques, campagnols des champs, rats bruns et rats noirs et pour le Luxembourg des souris domestiques aussi, à tous les stades de développement. BRODILUX CEREALS est à base de brodifacoum, puissante substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique, permettant le contrôle complet des populations de rongeurs et brisant toutes les résistances connues. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie vis-à-vis de l'appât. Brodilux® Cereals est un mélange bien équilibré de 5 éléments spécifiquement étudiés pour attirer les espèces de rongeurs susvisées : maïs concassé, flocons d'avoine, grains entiers de tournesol, sucre et la technologie FLUO-NP® - un adjuvant spécial qui rend l'appât facilement identifiable même dans de mauvaises conditions d'éclairage et qui peut aussi détecter les fèces des rongeurs clairement visibles sous la lumière UV. En faisant briller une lampe UV portable (lumière noire) sur les excréments de rongeurs, il est facile d'identifier et de suivre les mouvements des rongeurs. Cet appât est idéal pour les traitements des rats noirs et campagnols des champs et dans toutes les situations où le régime alimentaire des rongeurs est principalement basé sur la consommation de graines de maïs, comme dans les bâtiments ruraux et zootechniques, les greniers, les porcheries et dans certains types de bâtiments civils et industrielles (fabrication d'aliments pour les animaux, traitement de la farine, moulins, etc.). Brodilux® Cereals contient un agent amérissant (*Benzoate de dénatonium*) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

Mentions de danger : Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Conseils de prudence :** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Ne pas respirer les poussières. Consulter un médecin en cas de malaise. (BE) Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales/régionales applicables. (LU) Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation locale.



ATTENTION

UFI : 7630-P012-M005-4Y95

INSTRUCTIONS D'EMPLOI :

Campagnols des champs - grand public (non professionnels) - intérieur et extérieur autour des bâtiments

(LU) Contre les **souris domestiques** (*Mus musculus*) - Utilisation à l'intérieur : 45-50 g d'appât par point d'appât espacé de 2-5m.

Contre les **campagnols des champs** (*Microtus arvalis*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments : 45-50 g d'appât par point d'appât espacé de 2-5m. Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Les postes d'appâtage doivent être inspectés au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Utilisation en extérieur autour des bâtiments : Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Rats - grand public (non professionnels) - intérieur et extérieur autour des bâtiments
Organismes cibles : Rat brun (*Rattus norvegicus*), Rat noir (*Rattus rattus*)

Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Dose : 90-100 g d'appât par point d'appât espacé de 5-10m. Les postes d'appâtage doivent être inspectés seulement 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Utilisation en extérieur autour des bâtiments : Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Distribué par :

Pelsis Belgium SA
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel. : 03 886 22 11 • info@edialux.be



Scan für Gebrauchsanweisung auf Deutsch:



CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où elles peuvent entrer en contact avec l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

MESURES DE GESTION DES RISQUES

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés. Étiqueter les postes d'appâtage selon les indications mentionnées dans la présente étiquette. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de suspicion d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. (BE) Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée. (LU) Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale. **Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments :** Ne pas utiliser le produit à proximité d'eaux de surface (e.g. rivières, étangs, cours d'eau, digues, canaux d'irrigation).

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS ET LES MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. Antidote : Administration de Vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer la peau à l'eau. Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON (LU tél. : +352 8002-5500)/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un CENTRE ANTIPOISON (LU tél. : +352 8002-5500)/un médecin. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. En cas de symptômes : Appeler le 112/ambulance pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : Appeler un CENTRE ANTIPOISON (LU tél. : +352 8002-5500)/un médecin. Informations au personnel de santé / au médecin : Initier les mesures de premiers secours si nécessaire, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON (LU tél. : +352 8002-5500). Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. EN CAS D'INHALATION : Si des symptômes apparaissent, appeler un centre anti-poison (LU tél. : +352 8002-5500)/un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « Ne pas déplacer ni ouvrir. Contient un rodenticide : Brodilux Cereals, Numéro d'autorisation BE2025-0008 / LU0034691-0000. Substance active : Brodifacoum En cas d'incident, contacter un centre anti-poison Belgique : 070 245 245 - Luxembourg : (+352) 80 02 55 00 ». Dangereux pour la faune.

CONSIGNES POUR UNE ELIMINATION SURE DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes...) ni dans les égouts.

(BE) L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée. (LU) Au terme de la période de traitement, éliminer l'appât non consommé et l'emballage conformément à la législation nationale en vigueur (centre de recyclage).

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DUREE DE CONSERVATION

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Durée de conservation : 2 ans après production. Stocker le produit à une température inférieure à 35°C. Stocker le produit à l'abri de la lumière. Ne pas stocker à proximité des denrées alimentaires et boissons destinées à la consommation humaine et animale.

AUTRES INFORMATIONS

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amérissant et un colorant.

GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

Meer informatie:

Plus d'information :

www.edialux.com