

## Mulocam

(PT14) BIOCIDES - RODENTICIDES - Lokmiddel klaar voor gebruik (RB)  
 Gewaarborgde samenstelling: 0,001 % Brodifacoum (CAS 56073-10-0)  
 Niet-professioneel gebruik (breed publiek)  
 Toelatingsnummer: BE2020-0001  
 Toelatingshouder: Triplan SA, La Poste Française BP 258, AD AD500 Andorra La Vella, tel : +376741454  
 UFI : 7Q8C-WEHE-R126-SYQR

### GEbruik

Mulocam is een zeer effectief middel ter bestrijding van ratten en muizen op basis van Brodifacoum met gepelde haver in individuele zakjes. De granen zijn bijzonder smakelijk voor bosmuizen en veldmuizen (woelmuisen), maar zijn ook geschikt voor de bestrijding van muizen en ratten. Dit product is bestemd voor gebruik in en rond gebouwen door niet-professionele en professionele gebruikers. Het product mag alleen door professionele gebruikers worden gebruikt in de open lucht, op vuilstorplaatsen en op stortplaatsen.

**Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Vóór gebruik steeds het etiket lezen en de gebruiksaanwijzing volgen.**

### ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfecteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdiervoorkeur is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).
- Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt. De zakjes met het lokaas niet openen.
- Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere nietdoeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Plaats lokaasdozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.
- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelingsperiode.
- Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdünnende rodenticiden effectief zijn.
- Dit product bevat monopropyleenglycol, een bitterstof en triëthanolamineen, een kleurstof.

### DOSERING

Vijanden	Ratten	Huismuizen	Bosmuizen, veldmuizen
<b>Dosis/ lokaaspunt</b>	100 g lokaas per lokaaskist	30-40 g lokaas per lokaaskist	50 g lokaas per lokaaskist
<b>Gebruik</b>	Binnen, buiten en buiten rond gebouwen Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen	Binnen Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen	Binnen, buiten en buiten rond gebouwen Kant-en-klaar lokaas dat moet worden uitgelegd in tamper-resistent lokaasdozen
<b>Afstand tussen lokaasdozen</b>	elke 5-10 meter	elke 1-2 meter	elke 1-2 meter

**Huismuizen:** Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

**Ratten, bosmuizen, veldmuizen:** De aasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen. Plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

### RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Gebruik bloedverdünnende rodenticiden niet als permanent lokaas (bijv. ter preventie van knaagdiervorplagen of om knaagdiervoorkeur te detecteren).
- Uitsluitend gebruiken in tamper resistent lokdozen.
- Etiketteer lokdozen conform de productaanbevelingen.
- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen.
- In geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdiervoorkeur waargenomen): raadpleeg de productleverancier of bel een plaagbestrijdingsdienst.
- Zoek en verwijder dode knaagdieren tijdens de behandeling ten minste zo vaak als aas stations worden geïnspecteerd.
- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten.

### EERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloedingstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine. Tegengif: vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.
- Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

Aasstations moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "Mulocam of toelatingsnummer"; "werkzame stof" en "bel in geval van een incident een antigifcentrum". Gevaarlijk voor dieren in het wild. **Tel. Antigifcentrum: 070 245 245**

### WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende uit het gebruik van dit product op niet gecontroleerde toepassingen.

### INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT EN ZIJN VERPAKKING

Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten. Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

### VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN DE HOUBAARHEID VAN HET PRODUCT ONDER NORMALE OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren. Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren. Houdbaarheidstermijn : 24 maanden na productie (zie verpakking). In originele verpakking bewaren.

### Verdeeld door:

Pelsis Belgium NV  
 Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
 Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

## Mulocam

(PT14) BIOCIDES - RODENTICIDES - Appât prêt à l'emploi (RB)  
Composition garantie : 0,001 % Brodifacoum (CAS 56073-10-0)  
Usage non professionnel (grand public)  
Numéro d'autorisation : BE2020-0001; Numéro d'autorisation pour G.-D. du Luxembourg : 13/20/L-000  
Défendeur de l'autorisation : Triplan SA, La Poste Française BP 258, AD AD500 Andorra La Vella,  
tel : +376741454  
UFI : 7Q8C-WEHE-R126-SYQR

### USAGE

Mulocam est un produit raticide et souricide très performant à base de Brodifacoum sur avoine décorquée en sachets individuels. Les graines sont particulièrement appétantes pour les mulots et les campagnols, mais fonctionnent également sur les souris et les rats. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments par les non-professionnels et les professionnels. Le produit peut être utilisé par les professionnels uniquement dans des zones ouvertes extérieures, dans les déchetteries et les décharges.

**Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.**

### CONSIGNES D'UTILISATION

- Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple).
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
- Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non-cibles.
- Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.
- Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Ce produit contient du Monopropylène glycol, de la Triéthanolamine, un agent amérissant et un colorant.

### DOSAGE - Grand public (non-professionnelle)

Organisme cible	Rats	Souris domestique	Mulots, Campagnols communs
<b>Dose par poste d'appâtage</b>	100 g d'appâts par point d'appâtage	30-40 g d'appâts par point d'appâtage	50 g d'appâts par point d'appâtage
<b>Usage</b>	Intérieur, extérieur ou extérieur autour des bâtiments Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.	Intérieur Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.	Intérieur, extérieur ou extérieur autour des bâtiments Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
<b>Distance minimale séparant deux postes</b>	Tous les 5 à 10 mètres	Tous les 1 à 2 mètres	Tous les 1 à 2 mètres

**Souris** : Les postes d'appâtage doivent être inspectés au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

**Rats, mulots, campagnols communs** : Les postes d'appâtage doivent être inspectés au minimum tous les 5 à 7 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacez tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

### MESURES DE GESTION DE RISQUE

- Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs).
- A utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement.
- Etiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit.
- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.
- En cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.
- Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés.
- Éliminer les cadavres de rongeurs conformément à la réglementation locale.

### INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. Antidote: administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

En cas :

- d'exposition cutanée : nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse
- d'exposition oculaire : rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes
- d'exposition orale : rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement.
- En cas d'ingestion : consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette.

Contactez un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: "ne pas déplacer ni ouvrir"; "contient un rodenticide"; "Mulocam ou numéro d'autorisation"; "substance active" et "en cas d'incident, contacter un centre antipoison". Dangereux pour la faune. **Tél. Centre Antipoisons 070 245 245 pour le G.-D. de Luxembourg : (+352) 8002 5500**

### GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

### CONSIGNES POUR UNE ELIMINATION SURE DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

### CONDITIONS DE STOCKAGE ET DUREE DE CONSERVATION DU PRODUIT DANS DES CONDITIONS NORMALES DE STOCKAGE

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Durée de conservation : 2 mois après production (voir emballage). Conserver dans le récipient d'origine.

### Distribué par :

Pelsis Belgium SA  
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
Tél.: 03 886 22 11 • info@edialux.be