

## Storm<sup>®</sup> Ultra Secure

Lokmiddel (klaar voor gebruik) RB - Biocide PT14 - Rodenticide  
Gewaarborgde samenstelling: Flocoumafen (CAS 90035-08-8) 0,0025%  
Toelatingshouder: BASF Belgium Coordination Center, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, België  
Toelatingsnummer: BE2018-0034  
Uitsluitend voor grote publiek.  
TEL Antigifcentrum: 070 245 245

**VEILIGHEID:** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Bevat Bifenyl-2-ol (CAS 90-43-7). Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof: Bifenyl-2-ol (CAS 90-43-7)

**SICHERHEIT:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sorgfältig lesen und alle Anweisungen befolgen. Enthält Bifenyl-2-ol (CAS 90-43-7). Besorgniserregende Stoffe: Bifenyl-2-ol (CAS 90-43-7).

### Gebbruik 1 : Ratten - breed publiek - binnen:

**Doelorganisme:** Bruine rat (*Rattus norvegicus*), Zwarte rat (*Rattus rattus*) (jonge en volwassen dieren)

Lokaas, klaar voor gebruik, toe te passen in een manipulatiebestendige lokaasdoos.

**Dosering en frequentie:** 50 - 75 g per lokaasdoos (25 g : 2-3 blokken).

Indien er meer dan 1 lokaasdoos nodig is, dient de afstand tussen de lokaasdozen 5 tot 10 meter te bedragen. Na de eerste toepassing zijn maximaal 3 keer aanvullingen van het lokaas nodig, met optimale timing op dagen 1, 4, 8 en 15.

**Gebbruik-specifieke gebbruiksinstructies:** De lokaasdozen moeten 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling worden bezocht en daarna tenminste wekelijks, om te controleren of het lokaas wordt geaccepteerd, de lokaasdozen intact zijn en om knaagdierlichamen te verwijderen. Vul het lokaas bij indien nodig. Na de eerste toepassing zijn maximaal drie aanvullingen nodig, met optimale timing op dagen 1, 4, 8 of 15.

**Gebbruik-specifieke risicobepalende maatregelen:** Plaats geen lokaasdozen in de buurt van waterafvoersystemen waar ze in contact kunnen komen met water. Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelingsperiode. Zoek en verwijder dode knaagdieren tijdens de behandeling, minstens zo vaak als lokaasdozen worden geïnspecteerd. Uit de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiting) moet duidelijk blijken dat het product moet worden gebruikt in geschikte manipulatiebestendige lokaasdozen (bijv. "Gebruik enkel in manipulatiebestendige lokaasdozen")

### Gebbruik 2 : Ratten - breed publiek - buiten, om en rond gebouwen

**Doelorganisme:** Bruine rat (*Rattus norvegicus*), Zwarte rat (*Rattus rattus*) (jonge en volwassen dieren)

Lokaas, klaar voor gebruik, toe te passen in een manipulatiebestendige lokaasdoos.

**Dosering en frequentie:** 50 - 75 g per lokaasdoos (25 g : 2-3 blokken).

Indien er meer dan 1 lokaasdoos nodig is, dient de afstand tussen de lokaasdozen 5 tot 10 meter te bedragen. Na de eerste toepassing zijn maximaal 3 keer aanvullingen van het lokaas nodig, met optimale timing op dagen 1, 4, 8 en 15.

**Gebbruik-specifieke gebbruiksinstructies:** Bescherm het lokaas tegen de atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, enz.). Plaats de lokaasdozen in gebieden die niet vatbaar zijn voor overstromingen. Vervang al het lokaas in een lokaasdoos waar het lokaas beschadigd of besmet is (bijv. door vocht, vuil, enz.). De lokaasdozen moeten 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling worden bezocht en daarna tenminste wekelijks, om te controleren of het lokaas wordt geaccepteerd, de lokaasdozen intact zijn en om knaagdierlichamen te verwijderen. Vul het lokaas bij indien nodig. Na de eerste toepassing zijn maximaal drie aanvullingen nodig, met optimale timing op dagen 1, 4, 8 of 15.

**Gebbruik-specifieke risicobepalende maatregelen:** Plaats geen lokaasdozen in de buurt van waterafvoersystemen waar ze in contact kunnen komen met water. Verwijder de lokaasdozen en/of het resterende lokaas na het beëindigen van de toepassingsperiode. Zoek en verwijder dode knaagdieren gedurende de behandelingsperiode, zeker op de momenten dat de inspectie van de lokaasdozen plaats vindt. Uit de productinformatie (etiket en/of brochure) moet duidelijk blijken dat het product dient te worden toegepast in manipulatiebestendige lokaasdozen (vb. 'alleen toepassen in manipulatiebestendige lokaasdozen'). Om het risico op secundaire vergiftiging via slakken te voorkomen, controleer het lokaas en lokaasdozen regelmatig op de aanwezigheid van slakken gedurende de toepassingsperiode. In het geval dat slakken aanwezig zijn, verplaats het lokaas en/of lokaasdoos naar een ander geïnfesteerd gebied, waar geen slakken aanwezig zijn. Verzamel slakken die in de buurt van lokaasdozen aanwezig zijn en verwijder de slakken op een zodanige manier dat niet-doelorganismen niet kunnen worden blootgesteld. Het lokaas moet op een zodanige manier worden toegepast dat het niet in aanraking kan komen met water en niet kan worden weggespoeld. Plaats geen lokaas in de buurt van watergangen wanneer er hevige regenval wordt verwacht.

### ALGEMENE GEBBUIKSAANWIJZING

Grote publiek : Lees en volg de productinformatie en alle informatie die bij het product

wordt geleverd of die op het verkooppunt wordt verstrekt voordat u het gebruikt. Houd u aan de gebruiksaanwijzing. Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselresten). Afgezien hiervan, reinig het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling, omdat dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van het lokaas bemoeilijkt. Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden moeten niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijv. vallen) worden overwogen. Lokaasdozen moeten worden geplaatst in de directe omgeving waar knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. loopsporen, nestplaatsen, voedingsplaatsen, holen, enz.). Waar mogelijk moeten lokaasdozen aan de grond of andere constructies worden bevestigd. Plaats lokaasstations/producten buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, vee en andere niet-doel dieren. Plaats lokaasdozen uit de buurt van etenswaren, dranken en diervoeders, en ook niet of plaatsen of oppervlakken die hiermee in contact kunnen komen. Plaats geen lokaasdozen in de buurt van waterafvoersystemen waar ze in contact kunnen komen met water. Bij gebruik van het product niet eten, drinken of roken. Was de handen en de direct blootgestelde huid na gebruik van het product. Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelingsperiode.

**Risicobepalende maatregelen:** Grote publiek : Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (gaten dichten, potentieel voedsel en drinken zoveel mogelijk verwijderen) om de productinname te verbeteren en de kans op herinfestatie te verkleinen. Informeer waar mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstaanders (bijv. gebruikers van het te behandelen gebied en hun omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne". Zoek en verwijder dode knaagdieren tijdens de behandeling, minstens zo vaak als de lokaasdozen worden geïnspecteerd. Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de toestand van de infestatie en van de werkzaamheid van de bestrijding. Gebruik geen anticoagulantia rodenticiden als permanent lokaas (bijv. voor het voorkomen van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit op te sporen.). Gooi dode knaagdieren weg in overeenstemming met de lokale voorschriften. Het product moet worden gebruikt in geschikte manipulatiebestendige lokaasstations (bijv. "alleen gebruik in manipulatiebestendige lokaasdozen"). Gebruikers moeten lokaasstations correct etiketteren met de informatie waarnaar wordt verwezen in punt 5.3 van de SPC (bijv. etiketteer lokaasstations volgens de productaanbevelingen"). Het gebruik van dit product zou knaagdieren binnen 35 dagen moeten elimineren. In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiting) moet duidelijk worden aanbevolen dat in geval van een vermoeden van gebrek aan werkzaamheid aan het einde van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen), de gebruiker advies moet inwinnen bij de leverancier van het product of een ongediertebestrijdingsdienst moet bellen. Was de lokaasdozen niet met water tussen de toepassingen door.

### Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:

Dit product bevat een anti-coagulant. Indien ingeslikt kunnen symptomen, zoals bloedneuzen en bloedend tandvlees vertraagd optreden. In ernstige gevallen kunnen blauwe plekken waargenomen worden en er kan bloed worden aangetroffen in de urine en/of ontlasting. Het antigif Vitamine K1 kan alleen door medisch personeel worden toegediend. BIJ CONTACT MET DE HUID: Was de huid met water. Als er symptomen optreden, neem dan contact op met een ANTIGIFCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Als de symptomen optreden, spoel dan met water. Contactlenzen uitdoen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Bel een antigifcentrum of een dokter. NA INADEMING: niet van toepassing. NA INSLIKKEN: Mond spoelen. Bij symptomen: Bel onmiddellijk 112/ambulance voor medische hulp. Als er geen symptomen zijn: neem contact op met een antigifcentrum of een arts. Informatie aan zorgpersoneel/arts: Start indien nodig levensondersteunende maatregelen en bel daarna een ANTIGIFCENTRUM. Neem contact op met een dierenarts in geval van inslikken door een huisdier. Lokaasdozen moeten worden gelabeld met de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof" en "in geval van een incident, bel een antigifcentrum 070 245 245. Gevaarlijk voor wilde dieren. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand.

### Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking:

Aan het einde van de behandelingsperiode, verwijder onaangetaast lokaas en de verpakking overeenkomstig de lokale wet- en regelgeving. Hergebruik de verpakking niet voor andere doeleinden. Het gebruik van handschoenen wordt aangeraden.

### Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden:

Opslag in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Zorg ervoor dat de verpakking gesloten blijft en niet in direct zonlicht staat. Sla het product op in een opslag buiten bereik van kinderen, vogels, huisdieren en boerderijdieren. Niet bewaren in de buurt van eten, drinken en diervoeders. Houdbaarheidsduur: productiedatum +3 jaar (zie verpakking).

### OVERIGE INFORMATIE

Door het werkingsmechanisme, kan de werking van anti-coagulantia rodenticiden vertraagd 4 tot 10 dagen na opname van het lokaas optreden. Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang of grijper bij het verwijderen. Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.

### Verdeeld door:

Pelsis Belgium NV  
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
Tel : 03 886 22 11 • info@edialux.be

## Storm® Ultra Secure

Appât (prêt à l'emploi) RB - Biocide TP14 - Rodenticide  
Composition garantie: Flocoumafen (CAS 90035-08-8) 0,0025%  
Défendeur de l'autorisation: BASF Belgium Coordination Center, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgique  
Numéro d'autorisation: BE2018-0034 ; G.-D. Luxembourg: 178/20/L-000  
Uniquement pour le grand public.  
TEL Centre Antipoisons: 070 245 245 pour le G.-D. Luxembourg: (+352) 8002 5500

### SECURITE

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Contient Bifényl-2-ol (CAS 90-43-7). Substance préoccupante: Bifényl-2-ol (CAS 90-43-7).

### Utilisation 1 : Rats - grand public - intérieur

**Organisme cible :** Rat brun (*Rattus norvegicus*) ; rat noir (*Rattus rattus*) (juvéniles & adultes).  
Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés  
Fréquence d'application et dose à appliquer : 50 -75 g par point d'appât (25 g : 2 à 3 blocs).  
Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance entre les stations d'appât devrait être de 5 - 10 mètres. Après l'application initiale, un maximum de trois recharges est nécessaire. Le moment optimal est le jour 1, 4, 8 ou 15.

**Consignes d'utilisation spécifiques :** Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Après l'application initiale, un maximum de trois recharges est nécessaire. Le moment optimal pour les jours 1, 4, 8 ou 15.

**Mesures de gestion des risques spécifiques :** Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Retirer tout produit restant ainsi que les stations d'appâts au terme de la période de traitement. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants : le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, «à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement»).

### Utilisation 2 : Rats - grand public - extérieur autour des bâtiments

**Organisme cible :** Rat brun (*Rattus norvegicus*) ; rat noir (*Rattus rattus*) (juvéniles & adultes).  
Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Fréquence d'application et dose à appliquer : Rats : 50 -75 g par point d'appât (25 g : 2 à 3 blocs). Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 5-10 mètres. Après l'application initiale, un maximum de trois recharges est nécessaire. Le moment optimal est le jour 1, 4, 8 ou 15.

**Consignes d'utilisation spécifiques :** Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé (par des saletés, moisissures, etc.). Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Après l'application initiale, un maximum de trois recharges est nécessaire. Le moment optimal pour les jours 1, 4, 8 ou 15.

**Mesures de gestion des risques spécifiques :** Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Retirer tout produit restant ainsi que les stations d'appâts au terme de la période de traitement. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants : le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, «à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement»). Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire par les limaces/escargots, vérifier la présence de limaces/escargots sur les appâts et les postes d'appât à intervalles fréquents pendant le traitement. Si des limaces ou des escargots sont présents, déplacer les postes d'appât/d'appât à un autre endroit du site infesté par les rongeurs, loin des limaces et des escargots. Recueillir les limaces/escargots qui sont présents près ou dans la station d'appâtage et disposer des limaces/escargots de manière à ce que les animaux non ciblés ne soient pas exposés. Les appâts doivent être appliqués dans l'extérieur de sorte qu'ils ne viennent pas en contact avec l'eau et ne sont pas lavés. Ne pas placer l'appât près des cours d'eau lorsque de fortes pluies sont prévues.

### CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Grand public : Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Respecter les instructions d'utilisation. Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ail-

leurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non-cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

**Mesures de gestion des risques :** Grand public : Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale [La méthode d'élimination doit être décrite spécifiquement dans le RCP national et figurer sur l'étiquette du produit]. Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, «à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement»). Les utilisateurs doivent convenablement étiqueter les postes d'appâtage avec les informations visées à la section 5.3 du RCP (par exemple, «étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit»). L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications.

### Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement :

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement. En cas d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau. Si des symptômes se produisent, appelez un centre antipoison ou un médecin. En cas d'exposition oculaire, rincer les yeux avec de l'eau. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Appeler un centre antipoison ou un médecin. En cas d'exposition inhalatoire, pas applicable. En cas d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. En cas de symptômes : Appelez immédiatement le 112/ambulance pour obtenir une assistance médicale. Si vous n'avez pas de symptômes : Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Information du personnel de santé/médecin : Prendre des mesures de soutien de la vie si nécessaire, puis appeler un centre antipoison. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « ne pas déplacer ni ouvrir » ; « contient un rodenticide » « Storm Ultra BE2018-0034 » ; « Flocoumafen 0.0025% » et « en cas d'incident, contacter le centre antipoison 070 245 245 ». Dangereux pour la faune. Si un avis médical est nécessaire, avoir le contenant ou l'étiquette du produit à portée de main.

**Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage :** Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale [L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée]. Ne pas réutiliser le contenant à d'autres fins. Le port de gants est conseillé.

### Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage :

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Ne pas entreposer près des aliments, des boissons et de l'alimentation pour animaux. Durée de conservation : date de production + 3 ans (voir emballage).

### AUTRES INFORMATIONS

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.

### Distribué par:

Pelsis Belgium SA  
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
Tel : 03 886 22 11 • info@edialux.be



Meer informatie:

Plus d'information:

[www.edialux.com](http://www.edialux.com)